

موسوعة الحب

النيلات

(الجزء الثاني)

أ / حمدى مصطفى

برئسة : أ / ممدوح الفرمادوى

١١٥

طباعة ونشر
المؤسسة العربية الحديثة
الطبع ونشر وطبع
ج. ٢٠٢٠٢٠ - ٢٠٢٠٢٠٢٠ - ٢٠٢٠٢٠
لondon - لندن - LONDON

الثمرة ،

• تكلم الشخص العادي عر مرة فهو يعني الناتج النب اقابل للأكل مثل : الت ة أو البرتقالة ، ولكن بالذ ة لعلم النبات فالثمرة هي ال زع الذي يتكون من الزهر ، بعد الإخصاب وتحول البويخات إلى بذور ، وكل النباتات الزهرية تعطي ثماراً من نوع ما .




وظيفة الثمار ،

إن وظيفة الثمار أساساً هي حماية البذور ، كما أنها تساعد البذرة في الحصول على مكان تنبت فيه وتنمو ، وهذه الوظيفة الثانية تسمى «الانتشار» .

وتتم بطرق عديدة مختلفة فمثلاً تكون هناك ثمار حلوة عصارية تفرى الحيوانات بأكلها وتحمل البذور بعيداً ، حيث تخرج مع فضلاتها في مكان آخر .



كيف تتشكل الثمرة؟



الخوخ : ثمرة حقيقية تنمو من المبيض .


العنق : عنق الزهرة الذي يصبح ليفيما قوياً .

غلاف الثمرة الخارجى : الطبقة الخارجية من جدار الثمرة ، والتي تكون جلد أو قشرة الثمرة .

غلاف الثمرة الأوسط : الطبقة المتوسطة من جدار الثمرة ، والتي تكون كتلة الثمرة والجزء الصالح للأكل منها .

غلاف الثمرة الداخلى : في هذه الثمرة (الخوخ) أصبح الغلاف الداخلي صلباً لحماية البذرة ، ولما كانت ثمرة الخوخ تتكون من كربلة واحدة ومبين واحد ، لذا فهي تحتوى على بذرة واحدة ، والطبقات الثلاث : الخارجية والوسطى والداخلية تؤلف معاً غلاف الثمرة .

أنواع الثمار .



تنقسم الثمار إلى قسمين

رئيسين :

١- الثمار العصارية .

٢- الثمار الجافة .


أول : الثمار العصارية .

هي ثمار ذات جدار ثمري لحمي ، وهي عادة عصيرية حلوة ، وأغلب الثمار التي تؤكل تتبع هذا القسم (عدا البقول والمكسرات) .

الثمار العصارية الدهنية .

وهي ثمار عصارية تكونت من نمو مبيض واحد بالزهرة .

وهي ذات بذرة صلبة في وسطها ، مثل الخوخ والكريز والمشمش ، وهي ذات غلاف ثمري خارجي رقيق ، وغلاف أوسط لحمي ، وغلاف داخلي صلب يحتوى على البذرة ويحميها .



الثمار العنبية

تتميز هذه الثمار بأن غلافها الثمرى لحمى بالكامل وليس به طبقة صلبة فى الداخل وأنها تحتوى على عدة بذور.

(مثل العنب والطماطم) .

الثمار القشرائية


هي شكل خاص من الثمار العنبية ، يكون غلافها الثمرى الداخلى ثيفيا وغلافها الأوسط لحمى ، والخارجي على هيئة قشرة قوية عادة .

(مثل البطيخ والخيار والكوسة) .


الثمار البرتقالية

نوع خاص آخر من الثمار العنبية ، وتشتمل على ثمار فصيلة الموالح (البرتقال والليمون) وغلافها الخارجى هو القشرة السميكة ، والأوسط هو الطبقة البيضاء التى بداخله ، أما الغلاف资料 الداخلى فهو الغشاء القوى الذى يحيط بكل فص من فصوصها .

والجزء الذى نأكله ليس سوى نسيج مائى يحيط بالبذور .




طماطم



عنب




الخيار




بطيخ




ليمون



برتقال



يوسفى



كمثرى



أناناس


الثمار المعلوية الكالفة :

هي ثمار تكونت من المبيض مع أجزاء أخرى من الزهرة ، فيتضخم المبيض والتحت معاً ويصبحان عصاريين ، والجزء الذي نأكله يأتي من التحت ، أما المبيض فينمو ليكون الجزء الأوسط الذي يحتوى على البذور ويهميها .
(مثل التفاح والكمثرى) .

ثمار هر كبة لعالية :

كما أن الأزهار كثيراً ما توجد متجمعة في عناقيد تسمى (نورات) ، يحدث أحياناً أن تكون أزهار التمرة كلها لحمية وتكون تركيباً ثرياً واحداً يسمى الثمرة المركبة . (مثل التين) .
والبذور الصغيرة التي بداخلها هي ثمار منفصلة من نوع يسمى (القرظة) ، وهذا النوع الخاص من الثمار ليس كثير الشيوع ، ومن أمثلته الأخرى : التوت ، والأناناس .

فريز أحمر



فراولة



الثمار المتجهةة :

بعض الأزهار يكون لها عدد من المبايض بدلاً من مبيض واحد ، وعند إخصابها تنتج عنقوداً من الثمار الصغيرة ، قاتمة كلها سوية .

(مثل الفريز الأحمر والأسود) .

وفي حالة الفراولة تكون كل بذرة ثمرة من نوع القرظة ، أما الجزء اللحمي فهو التخت .

ولذلك فثمرة الفراولة ثمرة كاذبة بالإضافة لكونها متجمعة .

الثمار الجافة


الثمار الجافة يصبح فيها جدار الثمرة جافاً عندما تنضج البذور .

وعندما تنضج الثمار الجافة المتفتحة تنشق من تلقاء نفسها ، لكي تنطلق منها البذور .

القرنة :


وهي من مميزات الفصيلة البقولية مثل :

(الفول والبازلاء) وتحتوي كل قرنة على عدد من البذور ، وهي عادة تكون صالحة للأكل ومغذية جداً .



بازلاء فول

الخردلة :



منور كبس الراعي

وهي من الثمار الجافة المتفتحة ،
وهي تشبه ثمار القرنة ، الا ان لها
حاجزاً يقسمها طولياً الى حجرتين .
وتوجد البذور محمولة عليه .

العلبة :

هي من الثمار الجافة ، وتتفتح
لتحرر البذور ، وهي اما ان تنشق طولياً
واما بوساطة غطاء ، وأحياناً تتفتح
مجازأة ، وبعضها يتفتح بشكل مفاجئ
لينثر البذور .



زبق

ثمار جافة خلية المقفلة :

عباد الشمس

الثمار الجافة غير المفتوحة عبارة عن ثمار جافة لا تفتح من تلقاء نفسها عند النضوج .

جزر

ياسمين البر

الففيرة :

ثمرة من بذرة واحدة وغلافها قرنى جاف ، ومن أمثلتها : (عباد الشمس والجزر وياسمين البر) .

البذرة :

وهي ثمرة نباتات الحبوب والفصيلة التحيلية ، وهي عبارة عن ثمرة فقيرة التحم فيها غلاف الثمرة بخلاف البذرة ، ومن أمثلتها : (القمح والذرة والأرز) .


قمح

ذرة


أرز

السماراة :


الدب



الدردار




البُق




البلدفة :

وهي ثمار تشبه الثمار الفقيرة في تركيبها ، إلا أنها أكبر حجماً وغالباً هما الخارجي خشبي صلب عادة . ومن أمثلتها :

(ثمار البندق وثمار البلوط) .



بلوط




الانتشار البذور :

عرفنا أن للثمرة وظيفتين هما حماية البذرة ومساعدتها على الانتشار أو الانتشار .

ولفهم أهمية الانتشار يمكننا أن نتصور لو أن بذور شجرة سقطت على الأرض وأنبتت حيث سقطت ، فإن النباتات الصغيرة الناتجة عن ذلك ستتزاحم مع بعضها من أجل البقاء ، مما قد يجعلها تدمر بعضها البعض وتغنى كذلك لو حللت كارثة ما - مثل حريق الغابات - بمكان الشجرة الأم ودمرتها فإن كل سلالتها ستختفي معها إلى الأبد .

وهكذا تظهر ضرورة حمل البذور ونقلها بعيداً عن الشجرة الأم . وكلما انتشرت بعيداً قدر الإمكان كان ذلك أفضل .

وقد أوجد الخالق (عز وجل) للثمار العديد من الاختلافات والتحولات التي تؤمن الانتشار للبذور لحفظ الحياة على الأرض .



الثمار المتفجرة :

بعض النباتات تنشر بذورها بدفعها للخارج بقوة مثل القذيفة . وهذا يكون عادة في أنواع الثمار التي تجف وتنكسر لدرجة التوتر ، فعندما يبلغ التوتر درجة كبيرة تنفجر الثمرة فتطلق البذور بعيداً والانتشار بهذه الطريقة ينقل البذرة مسافات قصيرة فقط .

فباء الحمار :


نبات من نباتات البحر المتوسط ، وثماره تشبه الخيار الصغير ، وعندما تنضج ثماره تنطلق البذور بقوة بعيداً عن الحامل الذي يحملها .

إبرة الراعي :

تنطلق الكرابل الخمسة من القاعدة إلى أعلى فتنتشر البذور .

البلسم الأصفر :


الاسم العلمي لنبات البلسم الأصفر هو ، نولي تانجير ، ومعنىه ، ممنوع اللمس .



قباء الحمار



إبرة الراعي



البلسم الأصفر

الثمار التي تحملها الرياح




الدلب



الدردار



القرن الكبير



ياسمين برس



هندباء برس

كثير من النباتات تكيفت ثمارها لتلائم طريقة حمل الرياح لها . وتعتبر هذه أكثر الوسائل فاعلية في انتشار البذور .

الثمار المجنحة كثمار الدردار والدلبى تنتقل عادة مسافة قصيرة ولكنها تكفى لابعادها عن الشجرة الا لم ، وفي حالة العاصفة القوية فقد تنتقل مسافات تبعد كيلو مترات .


اما الثمار التي تسافر حقا فهي الثمار الصغيرة جداً ذات المظللات الريشية الشكل .

مثل ثمار الحور والهندباء التي تسبح في الهواء ، الذي قد يحملها مئات الكيلو مترات .

الثمار التي تحملها الماء :

ينمو تخيل جوز الهند على شواطئ الجزر في المحيط الهادئ والهندي ، وأحياناً تسقط الثمار في مياه البحر مباشرة أو يحمل المد ما سقط منها على الشاطئ ، وتكون القشرة السميكة التي تحيط بالبذرة مشبعة بالهواء ، ويدرك تطفو الثمرة داخل غلافها الواقي تحملها مياه البحر حتى تصل إلى شاطئ ما ، ربما يبعد مئات الكيلومترات عن النبات الأأم .

وهناك نباتات أخرى تحمل ثمارها على مياه البحار .



الثمار التي تتسار بوساطة الحيوان



الأرقطيون

يوجد لثمار بعض النباتات أشواك أو خطافات صغيرة ، تعلق هذه الأشواك ب أجسام أو فراء الحيوان فتنتقل هذه الثمار مع هذا الحيوان إلى مكان بعيد عن مكان النبات الأم وتسقط .



عنب

يوجد نباتات أخرى ثمارها فواكه (بالمعنى الذي يعرفه أغلبنا) فهي قابلة للأكل ، فبذورها لها غلاف سميك قوي ، يقاوم العصارات الهاضمة في بطون الحيوانات التي تأكلها .

فتخرج تلك البذور مع فضلات الحيوان بعد أن ينتقل بها وهي في بطنه مسافات طويلة .



توت أسود

كريز

تركيب البذرة


- ١ - غلاف البذرة أو القصرة .
- ٢ - مخزن الغذاء .
- ٣ - فلقة .
- ٤ - رويشة .
- ٥ - سويقة فلقية سفلی .
- ٦ - جذر .

تتكون البذرة من ثلاثة أجزاء :

الجذين ، ومخزن الغذاء ، وغلاف البذرة أو


القصرة .

• بذرة حادة فلفة واحدة :



الجذين : وهو الجزء الأساسي من البذرة والذى سينمو إلى نبات ويتكون من الجذير الذى سيصبح الجذر فيما بعد والرويشة وهى القمة النامية للساق المقبلة ، أما الجزء الذى يربط بينهما فيسمى السويقة الفلقية السفلية ، وتنمو منها ورقة بذرية واحدة أو اثنان هى الفلاتات .

• بذرة حادة فلفين :



مخزن الغذاء : وهو الاحتياطي المخزن من الغذاء الذى يتغذى عليه النبات النامي ، حتى يصبح قادراً على صنع غذائه .

غلاف البذرة أو القصرة :

وهي الطبقة الخارجية الواقية للبذرة ، وكثيراً ما تنمو لها أجزاء صغيرة تساعد فى انتشار البذرة .

الإنبات :



نقول ان البذرة أثبتت حينما تستيقظ من حالة الکمون ، وبدأ الجنين فيها في النمو إلى نبات صغير يتغذى على الغذاء الموجود في البذرة . ولکي تثبت البذرة يجب أن تكون ناضجة ومحفظة بحیويتها ، كما يجب أن توفر لها بيئة مناسبة .

إذا وضعت بذرة ناضجة حية في تربة رطبة ، فإنها تثبت .


وهي تمتص الماء أولاً خلال غلافها فتنتفخ حتى يتمزق الغلاف البذري ، ويجعل الماء جنين البذرة ينشط كيميائياً وبدأ في النمو .

وقوة انتفاخ البذرة عند امتصاصها للماء قوية جداً ، فإذا وضعت كمية من البذور جافة في زجاجة وأضفت إليها الماء ، فإن قوة انتفاخ البذور تحطم الزجاجة .




نمو النبتة نوعان :

1



- تحت أرضي ، وفيه تبقى البذرة تحت الأرض (مثل الفول) .


2



- فوق أرضي ، وفيه تدفع البذرة إلى أعلى خارج سطح التربة ، (مثل الخروع) .

النبات بذرة تحت أرضية :






3



- 1 - النباتات في بذرة باقلاء يخترق الجذير القصرة ثم ينمو إلى الأسفل .
- 2 - ينمو الجذر ليثبت البذرة بينما تنمو الرويشة إلى أعلى .

- 3 - الفلقتان اللتان تحتويان على الغذاء المخزن في هذه الحالة لا تغادران التربة .

- وينمو الساق من السويقة تحت الفلاقيمة إلى أعلى ، ويكون زوج من الأوراق . إنها أوراق حقيقية ، وليس فلقات .



نبات بذرة فوق أرضية:

١- بذرة الخروع امتصت الماء وانشق خلافها ويخرج الجذير خلال الفتحة وينمو إلى أسفل .


٢- ينمو الجذير ويتفرع ، ويصبح الجذر الأساسي .

٣- تستطيل السويقة تحت الفلقية وتنمو الرويشة في الهواء إلى أعلى ، حاملة معها غلاف البذرة .


في الوقت الذي تمتضى الفلقتان الغذاء المخزن وتبث به إلى جميع أجزاء النبات ، وعندما يستهلك الغذاء المخزن تبدأ الفلقتان في التفتح وتصبحان أول ورقتين .

٤- تظهر الرويشة بين الفلقتين ، وتخضر الفلقتان وتبدآن في القيام بعمل الأوراق ، ويمكن الآن للنبات أن يبدأ في صنع غذائه بعمليّة البناء الضوئي بمساعدة الكلوروفيل ، وبامتصاص الأملاح من التربة .


بذور الأكل :




بطو لذكـل



بطو لسلطـج مـلـهـا إـلـهـونـ فـدـالـيـهـ وـدـوـابـيـهـ



بطـو لـذـكـل بـطـو لـذـكـهـ



بطـو لـجـمـعـهـ وـلـصـفـحـهـ لـصـلـمـ الدـاءـ وـالـعـوـبـاتـ


ينقسم الطعام الذي نأكله إلى قسمين رئيسيين ، فهناك أغذية بناء الجسم التي نحتاج إليها في مرحلة النمو ، وكذلك هي « ترميم وصيانة » أنسجة الجسم بعد أن تتوقف عن النمو ومن مميزات هذه الأغذية أنها تحوي النيتروجين في صورة بروتينات وعناصر أخرى كالفسفور والكالسيوم .

وهناك أيضاً أغذية الطاقة التي تزود الجسم بالطاقة والحرارة اللازمتين للحياة ، وأهم هذه المواد هما الكربوهيدرات : « النشا والسكر » والدهون .


والبذرة تزود النبات الصغير بحاجته لهذه الغرضين حتى يبدأ هي صنع غذائه بنفسه ، والمواد التي تحتوي عليها البذرة هي نفسها التي يحتاج إليها الإنسان والحيوان ، ولذلك فإن جزءاً كبيراً من الغذاء النباتي الذي نأكله يتتألف من البذور .

نباتات ذات الفلقة الواحدة وذات الفاقتين

ملامح مميزة لذات الفلقة الواحدة



ملامح مميزة لذات الفاقتين



تنقسم النباتات المزهرة إلى قسمين

رئيسيين هما :

نباتات ذات فلقة واحدة ونباتات ذات

الفاقتين .

والفلقات هي الأوراق التي توجد أصلاً

في جذين النبات قبل انبات البذرة .

أحياناً تظهر هذه الأوراق البذرية فوق

سطح التربة بعد الانبات في صورة أول

ورقتين خضراوين وفي نباتات أخرى تعمل

كمخزن للغذاء ولا تتحذ أبداً شكل الأوراق

العادية ، وهناك خواص أخرى تميز نباتات

كل قسم عن الآخر .

وعموماً فإن نباتات ذات الفاقتين أكثر

عدداً وتنوعاً من ذات الفلقة الواحدة ،

فجميع الأشجار والشجيرات المزهرة (عدا

النخيل) من ذات الفاقتين ، كذلك أغلب


النباتات ، أما مجلموعة الحبوب

والنجيليات ، فهي من ذات الفلقة الواحدة

وهي نباتات غذائية مهمة .

الجذر :


يحصل النبات على بعض غذائه من التربة وعلى بعضه الآخر من الهواء ، والغذاء الذي يحصل عليه النبات من التربة يتكون من الماء المذاب فيه المواد المعدنية ، وامتصاص هذا الماء إحدى وظائف الجذر الأساسية ، والوظيفة الأخرى المهمة هي تثبيت النبات .



منظر مكبر جداً للجذر يقوم بعمله .

الجذر هو ذلك الجزء من النبات الذي يتغذى في التربة بغرض الحصول على الغذاء وامتصاصه ، ومنذ بدء نبات البذرة يبدأ في النمو وشق طريقه بالقوة في التربة الصلبة ، وهو مهيأ لذلك ، فكل قمة جذرية تغطيها قلنسوة من خلايا مفلاطحة .

ويوجد خلف القلنسوة زغب كثيف أبيض ، يتكون من آلاف الشعيرات الدقيقة ، ووظيفة هذا الجزء من الجذر هي امتصاص الماء والأملاح المعدنية المذابة في التربة .




قطع عرضي مكبر جداً للجذر

أنواع الجذور:

1 — الهندباء البرية :


إن الجذر الرئيسي للهندباء هو الجذر الوتدى الذى يمتد إلى أسفل ، وتنتفرع الجذور الابتدائية لتكون جذوراً جانبية ثانوية .

ولكن طولها لا يصل أبداً إلى طول الجذر الوتدى .




2 — نبات الخروع :

فى هذا النوع من المجموع الجذري يتوقف نمو الجذر الوتدى سريعاً ، ويصبح النبات مثبتاً بوساطة الجذور الجانبية ، التى تكون خصلة كثيفة أو حزمة فى الأسفل .



جذر وتدى




الجذور العرضية

4 — الذرة :

يتالف الجذر في هذا النبات كما هو الحال في نباتات الحبوب الأخرى والنجيليات ، من جذور عرضية تنمو من العقد السفلي للساق .

3 — الجذو :

في مثل هذه النباتات يزيد الجذر الوتدى في السمك والطول ، وهو يؤدي الوظائف المعتادة ، وهي تثبيت النبات ، وامتصاص الماء والأغذية من التربة ، ولكنه أيضاً يعمل كمخزن للغذاء ، حتى يتمكن النبات من البقاء حياً خلاً فترة تكون غير ملائمة للنمو ، ومن هذا النوع أيضاً نبات اللفت والبنجر والجزر الأبيض .



5 — المنجروف :

شجرة تنمو عند الفتحات الطينية لأنها في المناطق الاستوائية، ويموت الجذر الأصلي الذي يكون مطموراً في الطين بسبب نقص الأوكسجين بعد نمو الساق مباشرةً، وتنمو الجذور العرضية من الساق إلى أسفل وتتفرع متخللة الطين.


وتكون أجزاء هذه الجذور التي تبقى فوق الطين مغمورة بالماء في المد العالي، أما في المد المنخفض فإنها تكون مكسوفة للهواء، وهذا يمكنها امتصاص الأوكسجين.

6 — شجرة العين البنغالي :


تنمو الجذور الهوانية

(العرضية) من الأفرع الطويلة الأفقيّة إلى الأسفل حتى تصل إلى التربة وتحترق التربة ويزيد سمكها لتكون جزءاً إضافيةً.

وهكذا تغطي الشجرة تدريجياً مساحات أوسع فأوسع.



الساق :




إن ساق النبات أو جذعه هو ذلك الجزء من النبات الذي يبدأ من فوق الجذر ثم يصعد (رأسياً عادة) ثم ينقسم إلى الفروع والأغصان التي تحمل الأوراق.

والساق ليست أساسية في حياة النبات كالجذور والأوراق ، إلا أنها تمكن النبات من الامتداد والارتفاع ، مما يجعله يحصل على مورد أفضل من الضوء والهواء اللازمين له ليعيش وينمو .

والتالي أن الساق تعمل كجسر يوصل بين الجذور والأوراق .

فهي أحياناً لا تكاد تظهر إطلاقاً كما في النباتات التي تنمو منبطحة فوق سطح الأرض .

وأحياناً تتخذ شكل تركيب ضخم يصل ارتفاعه إلى أكثر من ٩٠ متراً ، كما في أشجار الكافور الأسترالي .



الساق دعامة لحمل الفروع والأوراق :

في القشرة والأجزاء الداخلية للسيقان العشبية أو النجبلية (غير الخشبية) تكون خلايا مستطيلة قوية ومرنة .


وتؤلف هذه الخلايا مجتمعة الألياف التي تحمل ثقل الأوراق والثمار، وتجعل النبات ينتصب قائماً ضد الريح وتنمو السيقان القائمة لتحمل وزناً ليس بالقليل ، مما يجعلها في حاجة إلى نسيج دعامي خاص .

ولكي تقاوم هذه الخلايا التحلل بفعل البكتيريا والفطريات فإنها مشبعة بمواد كيميائية تمنع هذا التحلل .


وتنتقل السوائل في الساق عن طريق مجموعة من الأنابيب . فالخشب في الجزء المركزي من الساق ينقل الماء المحتوى على الأملاح المعدنية إلى أعلى من الجذور إلى الأوراق .

وينقل اللحاء (الموجود تحت القلف مباشرة) الماء المحتوى على المحاليل العضوية من الأوراق إلى جميع أجزاء النبات .

وعلى ذلك فهناك اتجاه صاعد خلال الخشب واتجاه هابط خلال اللحاء .




للسيقان النباتات: الجزوع :




سيقان خشبية ذات تفرعات عادة
كما فى أغلب الأشجار والشجيرات
(مثل شجرة البلوط والزان والتفاح) .
ولكنها أحياناً تكون غير متفرعة كما
فى التحيل .


الأعواد :

عبارة عن الأنابيب القوية
الصلبة مثل (الذرة والقمح
والشعير) والسيقان الصلدة
للنباتات العشبية مثل (الكرنب
وزهرة الربيع) وبعض سيقان
النباتات التي تعيش في الأماكن
الجافة والصحراوية ، تختزن فيها
الماء (مثل الصبار وغيرها من
النباتات العصيرية) .






ساق راحمة



ساق هشة



ساق ملتهبة

وقد تكون ساق النبات ضخمة جداً وطويلة ، كجذوع شجرة الكافور وشجرة السيكويا . وأحياناً تكون الساق ضعيفة بحيث لا تقوى على الوقوف وحدها دون دعامة تساعدها ، وفي هذه الحالة نجد نباتات تزحف على الأرض كما تفعل سيقان نبات « توت الأرض » وقد تصلب النباتات نفسها بوساطة « أظافير » وهي عبارة عن سيقان أو أوراق تحورت لهذا الغرض (مثل نبات البازلاء والحمص) . وهناك نباتات أخرى ترتفع بالتفاف سيقانها حول النباتات الأخرى مثل النباتات الملتقة في الغابات الاستوائية .

سيقان تدعى أورخية




كثير من النباتات لها سيقان تحت الأرض ، والبعض يظنها جذوراً ولكنها ليست كذلك ، وهي تخزن الغذاء الذي يصنع في الأوراق .

وهذه بعض الأمثلة لهذه النباتات :

1- **البصل** : سيقان قصيرة جداً ، تلتف حولها وتحميها أوراق شبه حرشفية تحتوي على مواد غذائية ، ومنها : البصل والنرجس البري .


2- **الدرنات** : سيقان تنتفخ تحت الأرض وتخزن المواد الغذائية ، والتي هي أساساً السكر والنشا والماء ، ومنها : البطاطس والتداليا .

3- **الريزومات** : سيقان طويلة نوعاً ، توجد تحت الأرض مباشرة ، وهي تنمو أفقية (على خلاف السيقان الأخرى الرأسية) . ومنها : زنبقة الوادي ونبات الأيرس .




سيقان حمل الكلوروفيل :

تصنع النباتات غذاءها وتعيش بوساطة عملية البناء الضوئي ، وهي تتم بمساعدة مادة الكلوروفيل في أوراقها . وفي النباتات التي اختزلت أوراقها أو تحورت إلى أشواك تكون الساق دانماً خضراء ، وهي التي تقوم بأداء هذه الوظيفة الأساسية في حياة النبات بدلاً من الأوراق .



سيقان غريبة :

في بعض نباتات الفصيلة الصبارية مثل نبات (أكينونوكاكتس) يكون النبات كله شوكياً على شكل كرة (وهي الساق) والأوراق متحورة إلى أشواك . يوجد نباتات غريب الشكل يسمى « موهلمبيكيا » تتخذ الساق شكل شريط طويلاً ، تخرج عليه قليل من الأوراق الحرشفية ، وهذا شكل آخر من أشكال تحور السيقان للاقلال من فقد الماء .



أكينونوكاكتس



موهلمبيكيا